



Отзывы о враче

Морозов Кирилл Владимирович

Врач-гинеколог, врач-УЗИ

Стаж более 22 лет

Кандидат медицинских наук

Специализация

- Все виды оперативных вмешательств в гинекологии;
- Хирургическое и терапевтическое лечение миомы матки;
- Оперативное и консервативное лечение эндометриоза;
- Пайпель-биопсия эндометрия;
- Оперативное лечение всех видов внутриматочной патологии;
- Ультразвуковая диагностика;
- Эстетическая гинекология (интимная пластика, лабиопластика, филлинг, аугментация точки С и прочие).

Образование

- ПИМУ 1999г. - Педиатрия
- ПИМУ 2002г. - интернатура на базе ОКБ им. Семашко по специальности "Акушерство и гинекология"
- ПИМУ 2013г. - профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика"
- Повышение квалификации:
- ПИМУ 2015г. - повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология"
- ПИМУ 2016г. - профессиональная переподготовка по специальности "Онкология"
- ПИМУ 2018г. - профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика"
- ПИМУ 2020г. - повышение квалификации по специальности "Акушерство и гинекология"

Требуется дополнительная подготовка

Подготовка к приему гинеколога

- Оптимальное время для визита к гинекологу 5-9 день цикла (после окончания месячных).
- Начало цикла - первый день месячных
- Конец - последний день перед следующими месячными
- Средняя длительность цикла - 28 дней (норма: 24-38 дней)

Подготовка к приему:

- перед приемом специалиста необходимо принять душ, не используя интимные гели и дезодоранты
- необходимо отказаться от половой жизни (за 1-2 дня)
- не употреблять алкоголь
- не использовать лечебные свечи (за 2 дня)

Важно: при аномальных выделениях не нужно ждать окончания менструации - лучше записаться на прием сразу.

УЗИ малого таза

Подготовка к исследованию включает общие рекомендации и специфические для конкретных методов:

- Соблюдение определенного режима питания в течение двух дней.
- Для профилактики вздутия живота за 2-3 дня до исследования рекомендуется принимать Эспумизан в предписанной врачом дозировке.
- Питье воды перед УЗИ (только при трансабдоминальном методе).
- Отказ от курения и алкоголя.
- Очищение кишечника при трансректальном исследовании.